


Differentialrechnung Anfänge

Leibniz 1646-1716, Newton 1643-1727

Wir ermitteln die Tangentensteigungen für verschiedene Funktionen f im Punkt $P(a | f(a))$.



$f(x) = x^2$	$2a$	
$f(x) = x^2 + 3$	$2a$	<i>Eine Zahl als Summand fällt weg.</i>
$f(x) = 4x^2$	$8a$	<i>Eine Zahl als Faktor bleibt erhalten (Faktorregel).</i>
$f(x) = x^2 + 4x$	$2a + 4$	
$f(x) = x^3$	$3a^2$	
$f(x) = x^3 + x^2$	$3a^2 + 2a$	<i>Summanden werden einzeln betrachtet.</i>
$f(x) = x^n$	na^{n-1}	

Betrachte $f(x) = x^2$. Statt $m_{Tangente} = 2a$ schreiben wir $f'(x) = 2x$ oder $(x^2)' = 2x$.

$f'(x) = 2x$ heißt 1. Ableitung von $f(x) = x^2$.

Die Funktion $f(x) = x^2$ wurde abgeleitet oder differenziert.

$f'(4) = 8$ bedeutet, dass die Tangentensteigung an der Stelle $x = 4$ (also im Punkt $P(4 | 16)$) 8 beträgt.

Das allgemeine Vorgehen (h -Methode), um die 1. Ableitung an der Stelle a zu ermitteln, lautet:

$$m_{Tangente} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Der auf der rechten Seite stehende Quotient heisst Differenzenquotient.

Nun sind wir in der Lage, Extrema (Minimum und Maximum) zu berechnen, genauer, die Punkte mit waagerechter Tangente, für die also $f'(x) = 0$ gilt.

In welchen Punkten besitzt die Funktion waagerechte Tangenten?

a) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$

b) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 8x + 7$

Differentialrechnung Anfänge

In welchen Punkten besitzt die Funktion waagerechte Tangenten?

c) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 8$

d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$


e) $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 9x$

f) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$


Differentialrechnung Anfänge

Lösungen:

a) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$
 $f'(x) = -x + 3$
 $0 = -x + 3$
 $x = 3 \quad \text{Max}(3 \mid 4,5)$



b) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 8x + 7$
 $f'(x) = -x^2 + 6x - 8$
 $0 = -x^2 + 6x - 8$
 $x_1 = 4, x_2 = 2, E_1(4 \mid \frac{5}{3}), E_2(2 \mid \frac{1}{3})$



c) $E_1(0 \mid 8), E_2(2 \mid 4)$

d) $E_1(3 \mid 7), E_2(1 \mid 11)$

e) $E_1(\frac{3}{2} \mid -\frac{27}{2}), E_2(-\frac{1}{2} \mid \frac{5}{2})$

f) $E_1(0 \mid 0), E_2(2 \mid -\frac{4}{3})$