


# Tangentensteigung

Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^2$ .

Um die Steigung der Tangente im Punkt  $P(1 \mid 1)$  zu bestimmen, ermitteln wir zunächst die Steigung der Sekante durch  $P(1 \mid 1)$  und  $Q(\quad \mid \quad)$ .

$Q$  soll so beweglich sein, dass er sich auf dem Graphen in Richtung  $P$  verschieben lässt.




# $h$ -Methode

Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^2$ .

Um die Steigung der Tangente im Punkt  $P(1 | 1)$  zu bestimmen, ermitteln wir zunächst die Steigung der Sekante durch  $P(1 | 1)$  und  $Q(1 + h | (1 + h)^2)$ .

$$\begin{aligned} m_{\text{Sekante}} &= \frac{(1+h)^2 - 1}{h} \\ &= \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} \\ &= \frac{2h + h^2}{h} \\ m_{\text{Sekante}} &= 2 + h \\ m_{\text{Tangente}} &= \lim_{h \rightarrow 0} (2 + h) = 2 \end{aligned}$$



Begründung für den letzten Schritt:

Je kleiner  $h$  ist, umso besser approximiert die Sekantensteigung die Tangentensteigung.

Um dieses zu verdeutlichen, wählen wir für  $h$  Werte, die gegen null streben und betrachten die Sekantensteigungen:

$h_1 = 0,1$	$m_1 = 2,1$
$h_2 = 0,01$	$m_2 = 2,01$
$h_3 = 0,001$	$m_3 = 2,001$
$h_4 = 0,0001$	$m_4 = 2,0001$
$h_5 = 0,00001$	$m_5 = 2,00001$
$\vdots$	$\vdots$

Die Folge der Sekantensteigungen strebt (monoton fallend, d.h. die Folgenglieder werden immer kleiner) gegen den Wert 2,0000 ..., also 2. Der Grenzwert (Limes) beträgt 2.

# Intervallschachtelung

Wir gehen der Frage nach, wie man aufgrund von Näherungen zu einem exakten Ergebnis gelangen kann.

Welches  $a$  ist hier nur möglich?

a)

$$\begin{aligned} 1,7 &< a < 2,4 \\ 1,97 &< a < 2,04 \\ 1,997 &< a < 2,004 \\ 1,9997 &< a < 2,0004 \\ &\vdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} -0,5 &< a < 0,4 \\ -0,04 &< a < 0,05 \\ -0,005 &< a < 0,004 \\ -0,0004 &< a < 0,0005 \\ &\vdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} &< a < \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} &< a < \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{6} &< a < \frac{1}{7} \\ &\vdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Um zu erkennen, auf welchen Wert sich eine Intervallschachtelung zusammenzieht, reicht die Kenntnis der rechten (bzw. linken) Intervallgrenzen aus.

Sprechweisen:

Die Folge (der Intervallgrenzen) strebt gegen  $a$ ,  
die Folge konvergiert gegen  $a$ ,  
der Grenzwert ist  $a$ ,  
der Limes ist  $a$ ,


$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

# Tangentensteigung $h$ -Methode

Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^2$ .


Um die Steigung der Tangente im Punkt  $P(a \mid a^2)$  zu bestimmen, ermitteln wir zunächst die Steigung der Sekante durch  $P(a \mid a^2)$  und  $Q(a + h \mid (a + h)^2)$ .

$$\begin{aligned} m_{\text{Sekante}} &= \frac{(a + h)^2 - a^2}{h} \\ &= \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} \\ &= \frac{2ah + h^2}{h} \\ m_{\text{Sekante}} &= 2a + h \\ m_{\text{Tangente}} &= \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a \end{aligned}$$




# Ableitungsfunktion $f'$

- a) Zwei geradlinig verlaufende Straßenabschnitte unterschiedlicher Höhe werden durch eine Kurve verbunden. Skizziere die Ableitungsfunktion.  
Diese Funktion gibt an jeder Stelle  $x$  die Steigung (d. h. Tangentensteigung) der Kurve an.




- b) Skizziere für diesen Kurvenverlauf die Ableitungsfunktion.




# Ableitungsfunktion $f'$

- a) Zwei geradlinig verlaufende Straßenabschnitte unterschiedlicher Höhe werden durch eine Kurve verbunden. Skizziere die Ableitungsfunktion.  
Diese Funktion gibt an jeder Stelle  $x$  die Steigung (d. h. Tangentensteigung) der Kurve an.



- b) Skizziere für diesen Kurvenverlauf die Ableitungsfunktion.




# Tangentensteigung $h$ -Methode

Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^3$ .

Um die Steigung der Tangente im Punkt  $P(a \mid a^3)$  zu bestimmen, ermitteln wir zunächst die Steigung der Sekante durch  $P(a \mid a^3)$  und  $Q(a+h \mid (a+h)^3)$ .

$$\begin{aligned} m_{\text{Sekante}} &= \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} \\ &= \frac{(a+h)(a+h)(a+h) - a^3}{h} \\ &= \frac{(a^3 + 3a^2h + \dots h^2 + h^3) - a^3}{h} \\ m_{\text{Sekante}} &= 3a^2 + \dots h + h^2 \\ m_{\text{Tangente}} &= \lim_{h \rightarrow 0} (3a^2 + \dots h + h^2) = 3a^2 \end{aligned}$$




$$(a+h)^3 = (a+h)(a+h)(a+h) = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3$$

# Vereinfachung

$$(a + h)^3 = (a + h)(a + h)(a + h) = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3$$

Es ist nicht erforderlich, die Klammern aufzulösen.

Wie kann der wesentliche Term  $3a^2h$  ermittelt werden?



Die Produkte, die beim Ausmultiplizieren entstehen, entsprechen den Pfaden.

Aus jeder Klammer von  $(a + h)(a + h)(a + h)$  wird  $a$  oder  $h$  ausgewählt.

$a^3$  entspricht dem Pfad  $aaa$ .

Zu  $3a^2h$  (nur ein  $h$ !) gibt es die Pfade  $aah$ ,  $aha$  und  $haa$ .

Wie lautet für  $(a + h)^4$  der Term, der nur ein  $h$  enthält,  
und wie der für  $(a + h)^5$ ?



# Tangentensteigung $h$ -Methode


Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^4$ .

Um die Steigung der Tangente im Punkt  $P(a | a^4)$  zu bestimmen, ermitteln wir zunächst die Steigung der Sekante durch  $P(a | a^4)$  und  $Q(a + h | (a + h)^4)$ .

$$\begin{aligned} m_{\text{Sekante}} &= \frac{(a + h)^4 - a^4}{h} \\ &= \frac{(a + h)(a + h)(a + h)(a + h) - a^4}{h} \\ &= \frac{(a^4 + 4a^3h + \dots h^2 + \dots h^3 + h^4) - a^4}{h} \end{aligned}$$

$$m_{\text{Sekante}} = 4a^3 + \dots h + \dots h^2 + h^3$$

$$m_{\text{Tangente}} = \lim_{h \rightarrow 0} (4a^3 + \dots h + \dots h^2 + h^3) = 4a^3$$





$$(a + h)^4 = a^4 + 4a^3h + 6a^2h^2 + 4ah^3 + h^4$$

# Faktorregel

Gegeben sind die Funktionen  $f(x) = x^2$  und  $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ .

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Steigungen?  
Verallgemeinere diesen.



Leite ab.

a)  $f(x) = -5x^2$


b)  $f(x) = x \cdot x^2$

c)  $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + 2$

# Faktorregel

Gegeben sind die Funktionen  $f(x) = x^2$  und  $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ .

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Steigungen?  
Verallgemeinere diesen.




Der Graph von  $f$  wird mit dem Faktor  $\frac{1}{2}$  in  $y$ -Achsenrichtung gestaucht.  
Die Steigung an der Stelle  $a$  halbiert sich.

$$f'(x) = 2x$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2x = x$$

$$g(x) = k f(x)$$

$$g'(x) = k f'(x)$$




# Zahl als Summand

$$f(x) = x^2 + 3$$


$$f'(x) = ?$$

Welches Schicksal widerfährt dem konstanten Summanden?



# Summenregel

Gegeben sind die Funktionen  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}x^3$  und  $k(x) = f(x) + g(x)$ .  
Wie lautet  $k'(x)$ ? Verallgemeinere dies.



Leite ab.

a)  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3$

b)  $f(x) = x^2 + x - 6$

c)  $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x^2 + 3x + 5$

Die Ableitung  $f'$  kann z. B. mit (Y1 =  $f(x)$ )  
Y2 = nDeriv(Y1, X, X) gezeichnet werden.

Steigung an einer Stelle mit dem GTR:

MATH | 8: nDeriv aufrufen

(derivation, Ableitung).

nDeriv(*Funktionsterm oder z.B. Y1, X, Stelle*), *X* ist der Variablenname.

# Quintessenz

$$f(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x^2 + 3x + 2 \quad \text{Zahl als Summand fällt raus.}$$

Faktorregel: Zahl als Faktor bleibt erhalten.


Potenzregel:

$$f(x) = x^n \\ f'(x) = nx^{n-1}$$

Ableitung (Steigung)  $m = 3$

$$f'(x) = \frac{1}{4} \cdot 3x^2 - 2 \cdot 2x + 3 \quad \text{Diese Zeile wird übersprungen.}$$


$$f'(x) = \frac{3}{4} \cdot x^2 - 4x + 3$$




Die Ableitung  $f'$  gibt für jede Stelle  $a$  die Steigung  $m$  der Tangente im Punkt  $P(a | f(a))$  an, es ist  $m = f'(a)$ .

Das Vorzeichen von  $f'(a)$  gibt Auskunft über das Steigen und Fallen von  $f$ .

1. Wie groß ist die Fläche, die die Tangente an der Stelle  $x = 1$  mit den Koordinatenachsen einschließt?




2. Welcher max. Steigungswinkel muss beim Fahren über den Hügel bewältigt werden?






1. Wie groß ist die Fläche, die die Tangente an der Stelle  $x = 1$  mit den Koordinatenachsen einschließt?



Tangentengleichung:  $y = -x + \frac{7}{2}$

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{8}$$

2. Welcher max. Steigungswinkel muss beim Fahren über den Hügel bewältigt werden?



$$f'(-6) = \frac{2}{3}$$

$$\alpha = 33,7^\circ$$

Ergänzung:

Wie groß ist der Steigungswinkel an der Stelle  $x = 3$ ?

$-18,4^\circ$

3. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$ .

Bestimme

- a) die Nullstellen
- b) die  $x$ - und  $y$ -Koordinate des Scheitels.
- c) Bestimme die Gleichungen der Tangenten in den Nullstellen.

4. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ .

Bestimme

- a) die Nullstellen
- b) die  $x$ - und  $y$ -Koordinaten der Punkte mit waagerechten Tangenten.

3. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$ .

Bestimme

a) die Nullstellen

$$x_1 = -2, x_2 = 6$$


b) die  $x$ - und  $y$ -Koordinate des Scheitels.

$$S(2 \mid 4)$$

c) Bestimme die Gleichungen der Tangenten in den Nullstellen.

$$\text{Tangente an der Stelle } x_1: y = 2x + 4$$

$$\text{Tangente an der Stelle } x_2: y = -2x + 12$$



4. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ .


Bestimme

a) die Nullstellen

$$x_1 = -3, x_2 = 0$$

b) die  $x$ - und  $y$ -Koordinaten der Punkte mit waagerechten Tangenten.

$$E_1\left(-2 \mid \frac{2}{3}\right), E_2(0 \mid 0)$$



5. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^3$ .


Bestimme

- die Nullstellen
- die  $x$ - und  $y$ -Koordinaten der Punkte mit waagerechten Tangenten.

6. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ .

- Ermittle die Steigungen in den Nullstellen.
- An welcher Stelle beträgt die Steigung 1, an welcher Stelle  $-1$ ?
- Untersuche, ob die Gerade  $y = -6x + 20$  eine Tangente ist.

7. Skizziere die Ableitungsfunktion von  $f$ .




5. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^3$ .

Bestimme

a) die Nullstellen

b) die  $x$ - und  $y$ -Koordinaten der Punkte mit waagerechten Tangenten.



6. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ .

a) Ermittle die Steigungen in den Nullstellen.


$$f'(-1) = 4, f'(3) = -4$$

b) An welcher Stelle beträgt die Steigung 1, an welcher Stelle  $-1$ ?  $f'(\frac{1}{2}) = 1, f'(\frac{3}{2}) = -1$

c) Untersuche, ob die Gerade  $y = -6x + 20$  eine Tangente ist.

keine Tangente, Tangente an der Stelle  $x = 4$  lautet:  $y = -6x + 19$

7. Skizziere die Ableitungsfunktion von  $f$ .



1. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^2$ .

Bestimme die  $x$ -Koordinaten der

- a) Nullstellen
- b) Punkte mit waagerechten Tangenten.



2. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^3 + 3x$

- a) Wie lautet die Gleichung der Tangente im Punkt  $P(-1 \mid ?)$ .
- b) Gib die  $x$ -Koordinaten derjenigen Punkte an, in denen die Funktion Tangenten besitzt, die parallel zur Geraden  $y = 15x + 1$  verlaufen.



3. Gegeben sind die Funktionen  $f(x) = -x^2 + 4$  und  $g(x) = x^2 - 5x + 6$ .

- a) Gibt es eine Stelle, an der  $f$  und  $g$  dieselbe Steigung haben?
- b) An welchen Stellen hat  $f$  Tangenten, die mit der  $x$ -Achse einen Winkel von  $45^\circ$  einschließen?

4. Gegeben ist der Graph der Funktion  $f$ . Skizziere auf diesem Zettel  $f'$ .



5. Gegeben ist der Graph von  $f'$ . Skizziere auf diesem Zettel  $f$ .  
Der Punkt  $P$  soll auf dem Graphen von  $f$  liegen.



1. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + x^2$ .


Bestimme die  $x$ -Koordinaten der

a) Nullstellen

$$x_1 = 0, x_{2/3} = \pm 2$$

b) Punkte mit waagerechten Tangenten.

$$E_1(0 | 0), E_{2/3}(\pm\sqrt{2} | 1)$$



2. Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^3 + 3x$

a) Wie lautet die Gleichung der Tangente im Punkt  $P(-1 | ?)$ .

$$y = 6x + 2$$

b) Gib die  $x$ -Koordinaten derjenigen Punkte an, in denen die Funktion Tangenten besitzt, die parallel zur Geraden  $y = 15x + 1$  verlaufen.

$$x_{1/2} = \pm 2$$

3. Gegeben sind die Funktionen  $f(x) = -x^2 + 4$  und  $g(x) = x^2 - 5x + 6$ .

a) Gibt es eine Stelle, an der  $f$  und  $g$  dieselbe Steigung haben?  $-2x = 2x - 5, x = \frac{5}{4}$



b) An welchen Stellen hat  $f$  Tangenten, die mit der  $x$ -Achse einen Winkel von  $45^\circ$  einschließen?

$$-2x = 1, x_1 = -\frac{1}{2}$$



$$-2x = -1, x_2 = \frac{1}{2}$$



4. Gegeben ist der Graph der Funktion  $f$ . Skizziere auf diesem Zettel  $f'$ .




5. Gegeben ist der Graph von  $f'$ . Skizziere auf diesem Zettel  $f$ .  
Der Punkt  $P$  soll auf dem Graphen von  $f$  liegen.



# Bergwanderung

Ein Wanderer steigt auf einen Berg, dessen Silhouette durch  $f(x) = 0,07x^2 - 0,01x^3$  gegeben ist (Angaben in *km*).


- Welche Querschnittslänge hat der Berg?
- Wie hoch ist der Berg?
- Wie groß ist der Anstieg maximal, wenn der Wanderer von Westen (von Osten) kommt?



# Bergwanderung

Ein Wanderer steigt auf einen Berg, dessen Silhouette durch  $f(x) = 0,07x^2 - 0,01x^3$  gegeben ist (Angaben in  $km$ ).

- Welche Querschnittslänge hat der Berg?
- Wie hoch ist der Berg?
- Wie groß ist der Anstieg maximal, wenn der Wanderer von Westen (von Osten) kommt?



Schnittpunkte mit der  $x$ -Achse:  $N_1(0 | 0)$ ,  $N_2(7 | 0)$

Max(4,667 | 0,508)

Wendepunkt (2,333 | 0,254)




maximaler Anstieg, Winkel

$$\alpha = \arctan(f'(2,333)) = 9,3^\circ$$

$$\beta = \arctan(f'(7)) = -26,1^\circ$$

Gegeben ist der Graph von  $f'$ .



Skizziere auf diesem Blatt einen möglichen Verlauf von  $f$ .




Gegeben ist der Graph von  $f'$ .

Skizziere auf diesem Blatt einen möglichen Verlauf von  $f$ .

$f$  hat an der Stelle  $x = 3$  einen Sattelpunkt.



Für  $f'$  liegt an der Stelle  $x = 2$  ein Vorzeichenwechsel von  $-$  nach  $+$  vor und an der Stelle  $x = 5$  von  $+$  nach  $-$ . Das bedingt für  $f$  ein Minimum und an der Stelle  $x = 2$  und ein Maximum an der Stelle  $x = 5$ .



Der Graph von  $f$  ist monoton fallend.

Startseite