


Rechnen mit Wurzeln

1. a) $\sqrt{49} = 7$, weil $7 \cdot 7 = 49$
- b) $(\sqrt{49})^2 = 49$ allgemein: $(\sqrt{a})^2 = a$, ($a > 0$)
- c) $3\sqrt{5} + 8\sqrt{5} = 11\sqrt{5}$
- d) $\sqrt{100a^2} = 10a$, ($a > 0$)
- e) $(\sqrt{2})^3 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- f) $\sqrt{9 \cdot 4} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{4} = 3 \cdot 2 = 6$
- g) allgemein: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- h) $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ (teilweises Wurzelziehen)
- i) $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$
- j) allgemein: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
- k) es gilt jedoch nicht $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$
- l) $\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2^1\sqrt{2}}{2^1} = \sqrt{2}$ (Rationalmachen des Nenners)
- m) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \frac{2+\sqrt{2}}{2-1} = 2+\sqrt{2}$

Wie lang ist die Quadratseite?



2. Zerlege wie in 1. h) :

- a) $\sqrt{40}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{48}$

3. Forme wie in 1. l) oder m) um:

- a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{3}-2}$ d) $\frac{4}{\sqrt{5}+1}$

4. Löse die Klammern auf:

- a) $(\sqrt{2}+3)^2$ b) $(4-3\sqrt{5})^2$ c) $(3\sqrt{2}+2\sqrt{3})^2$

5. Löse die Gleichungen nach x auf:

- a) $5x^2 - 6 = 4x^2 + 3$ b) $(x+5)(x-4) = x+16$
 c) $(x+4)^2 + (x-4)^2 = 34$ d) $(x+5)^2 + (x-5)^2 = 58$
 e) $x^2 - \frac{x^2-1}{2} = 13$ f) $\frac{x^2+5}{3} - \frac{x^2-1}{5} = 4$
 g) $2 - \frac{1}{\sqrt{x}} = a$ h) $x\sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{4} = 1$

Rechnen mit Wurzeln

1. a) $\sqrt{49} = 7$, weil $7 \cdot 7 = 49$
- b) $(\sqrt{49})^2 = 49$ allgemein: $(\sqrt{a})^2 = a$, ($a > 0$)
- c) $3\sqrt{5} + 8\sqrt{5} = 11\sqrt{5}$
- d) $\sqrt{100a^2} = 10a$, ($a > 0$)
- e) $(\sqrt{2})^3 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- f) $\sqrt{9 \cdot 4} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{4} = 3 \cdot 2 = 6$
- g) allgemein: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- h) $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ (teilweises Wurzelziehen)
- i) $\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$
- j) allgemein: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
- k) es gilt jedoch nicht $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$
- l) $\frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2^1 \sqrt{2}}{2^1} = \sqrt{2}$ (Rationalmachen des Nenners)
- m) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - 1} = 2 + \sqrt{2}$

2. Zerlege wie in 1. h) :

- a) $\sqrt{40}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{48}$

3. Forme wie in 1. l) oder m) um:

- a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt{3} - 2}$ d) $\frac{4}{\sqrt{5} + 1}$


4. Löse die Klammern auf:

- a) $(\sqrt{2} + 3)^2$ b) $(4 - 3\sqrt{5})^2$ c) $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})^2$

5. Löse die Gleichungen nach x auf:

- a) $5x^2 - 6 = 4x^2 + 3$ b) $(x + 5)(x - 4) = x + 16$
 c) $(x + 4)^2 + (x - 4)^2 = 34$ d) $(x + 5)^2 + (x - 5)^2 = 58$
 e) $x^2 - \frac{x^2 - 1}{2} = 13$ f) $\frac{x^2 + 5}{3} - \frac{x^2 - 1}{5} = 4$
 g) $2 - \frac{1}{\sqrt{x}} = a$ h) $x\sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{4} = 1$

Wie lang ist die Quadratseite?



Aus der Zeichnung ist der Flächeninhalt des Quadrats sofort zu erkennen, er beträgt 8 Flächeneinheiten.

Daher muss für x gelten:

$$\begin{aligned} x^2 &= 8 \\ x &= \sqrt{8} \end{aligned}$$

2. a) $\sqrt{4 \cdot 10} = 2\sqrt{10}$
- b) $5\sqrt{2}$
- c) $3\sqrt{5}$
- d) $4\sqrt{3}$

3. a) $\frac{1}{3}\sqrt{3}$
- b) $\sqrt{5}$
- c) $-\sqrt{3} - 2$
- d) $\sqrt{5} - 1$

4. a) $11 + 6\sqrt{2}$
- b) $61 - 24\sqrt{5}$
- c) $30 + 12\sqrt{6}$

5. a) $\begin{aligned} x^2 &= 9 \\ x_1 &= 3 \\ x_2 &= -3 \end{aligned}$

b) $6; -6$

c) $1; -1$

d) $2; -2$

e) $5; -5$

f) $4; -4$

g) $\frac{1}{(2-a)^2}$

h) $x\sqrt{x} = \frac{4}{3} \quad | (\)^2$


$$x^3 = \frac{16}{9}$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{16}{9}}$$


Rechnen mit Wurzeln Anwendung

Wie lang ist d ?


a)



b)




c)



Rechnen mit Wurzeln Anwendung


Wie lang ist d ?

a)




$$d^2 = 2 \quad \text{d.h.} \quad d = \sqrt{2}$$

b)




$$d^2 = 9 - 2 \cdot 2 = 5 \quad \text{d.h.} \quad d = \sqrt{5}$$

c)




$$d^2 = 25 - 2 \cdot 6 = 13 \quad \text{d.h.} \quad d = \sqrt{13}$$

Wurzelfunktion



Irrationale Zahlen, d. h. keine rationalen



$$\sqrt{2} = 1,414213562373095049 \dots \quad \text{löst } x^2 = 2.$$

$$1,414213562373095049 \cdot 1,414213562373095049 = 2,000000000000000000560908991588312401$$

Dass $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ usw. jeweils mit keinem Bruch $\frac{p}{q}$ übereinstimmt, verwundert nicht.

Wäre $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, so würde $2 = \frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q}$ folgen.

Wenn $\frac{p}{q}$ nicht weiter kürzbar ist, und dafür können wir sorgen, so kann $\frac{pp}{qq}$ auch nicht kürzbar sein, soll aber 2 ergeben. Das ist nur möglich, wenn $pp = 2qq$ ist. Dann wäre jedoch $\frac{pp}{qq}$ kürzbar.

Wir verwickeln uns in einen Widerspruch, der nur aufgelöst werden kann, wenn die Ausgangslage $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ als falsch erkannt wird.

2. Möglichkeit

Wäre $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, so würde $2 = \frac{p^2}{q^2}$, bzw. $2q^2 = p^2$ folgen.

$\frac{p}{q}$ ist nicht (weiter) kürzbar, dafür haben wir gesorgt.

Wir überlegen uns, dass die letzten Ziffern rechts und links von $2q^2 = p^2$ nicht gleich sein können, indem wir alle Möglichkeiten aufschreiben. Beachte, p und q können nicht auf null oder 5 enden.

Weiteres

Aus $2 = 10^q \frac{p}{q}$ würde $2^q = 10^p$, bzw. $2^q = 2^p \cdot 5^p$ folgen. Warum kann das nicht sein?

Die irrationalen Zahlen bilden zusammen mit den rationalen Zahlen \mathbb{Q} die reellen Zahlen \mathbb{R} .

Für theoretische Überlegungen (Länge einer Diagonalen) sind sie unverzichtbar. Für praktische Zwecke reichen Näherungen, die sind aus \mathbb{Q} . Eine Entscheidung x rational oder irrational wird im weiteren Unterricht nicht benötigt. Vermutlich ist z. B. $\pi^{\sqrt{2}}$ irrational. Bewiesen ist das nicht.

Siehe auch (Unterrichtende):

[rekursive Folgen](#)

[Kettenbrüche](#)

[Startseite](#)